

PROCEDURA DEZYNFEKЦИИ PAWILONU DLA PSOW PRZED KWARANTANNA I PO KWARANTANNIE

Roztwór do dezynfekcji Glan Clor 2006 2%.

Sprzątanie codziennie w nocy.

1. Ubrać odzież ochronną (kombinezon, rękawiczki, okulary ochronne, maseczkę).
2. Psy wyprowadzić do innego boksu.
3. Wynieść posłania i miski.
4. Sprzątnąć posadzkę i wymyć detergentem.
5. Zmyć posadzkę i ściany roztworem Glan Clor 2006 i pozostawić na 15 minut.
6. Spłukać ściany i posadzkę dużą ilością bieżącej wody a nadmiar zebrać ściągaczką.
7. Pozostawić pomieszczenie do wywietrzenia na 5 minut.
8. Włożyć czyste posłania oraz miski i wprowadzić zwierzęta.

PROCEDURA DEZYNFEKCJI PAWILONU DLA PSOW NA KWARANTANNIE I PO KWARANTANNIE

Roztwór do dezynfekcji Glan Clor 2006 o stężeniu 2%

Dezynfekcja wykonywana raz w miesiącu lub częściej.

1. Należy ubrać strój ochronny (kombinezon, okulary, maseczkę i rękawiczki jednorazowe).
2. Wyprowadzić psy do innego wolnego boksu.
3. Z boksu wyjąć posłania i miski, umyć powierzchnie detergentem.
4. Nanieść roztwór Glan Clor 2006 przy użyciu pianownicy Karcher na ściany, kraty i posadzkę i pozostawić na 15 minut.
5. Po 15 minutach zmyć ściany, kraty i podłogę bieżącą wodą, następnie osuszyć posadzkę przy użyciu ściągaczki.
6. Pozostawić pomieszczenie do wywietrzenia na co najmniej 5 minut.
7. Wnieść czyste posłania, miski i wprowadzić zwierzęta.

PROCEDURA DEZYNFEKCJI KORYTARZA NA PAWILONIE DLA PSÓW PRZED KWARANTANNĄ I PO KWARANTANNIE

Roztwór Glan Clor 2006 2 %.

Dezynfekcja 1 x dziennie w nocy lub częściej w razie potrzeby.

1. Zamieść lub ściagnąć ściągaczka nadmiar brudu.
2. Ubrać strój ochronny (kombinezon ,okulary ,maseczkę i rękawiczki jednorazowe).
3. Umyć detergentem posadzkę.
4. Nanieść roztwór Glan Clor 2006 na podłogę i odczekać 15 minut.
5. Umyć posadzkę szczotką i zmyć podłogę bieżącą wodą.
6. Pozostawić korytarz do wywietrzenia się na co najmniej 5 minut.
7. Namoczyć specjalistyczne maty dezynfekujące rozcieńczonym Virconem S.

PROCEDURA DEZYNFEKCJI KORYTARZA NA PAWILONIE DLA PSOW PRZED KWARANTANNA I PO KWARANTANNIE

Roztwór Glan Clor 2006 2 %.

Dezynfekcja 1 x w miesiącu lub częściej w razie potrzeby.

1. Zamieść lub ściągnąć ściągaczka nadmiar brudu.
2. Ubrać strój ochronny (kombinezon ,okulary ,maseczkę i rękawiczki jednorazowe).
3. Umyć detergentem posadzkę, płytki, kraty.
4. Nanieść roztwór Glan Clor 2006 na ściany, kraty oraz podłogę pianownicą Karcher i odczekać 15 minut.
5. Umyć wszystko szczotką i zmyć podłogę bieżącą wodą.
6. Pozostawić korytarz do wywietrzenia się na co najmniej 5 minut.
7. Namoczyć specjalistyczne maty dezynfekujące rozcieńczonym preparatem Vircon S.

**PROCEDURA MYCIA MISEK U PSÓW -KWARANTANNA I PSY PO KWARANATNNIE – ZLEW W
POMIESZCZENIU GOSPODARCZYM NA STARYM PAWILONIE**

1. Brudne miski po jedzeniu i wodzie wstępnie opłukać i umyć detergentem.
2. Spryskać rozcieńczonym preparatem Vircon S miski i zostawić na 30 minut.
3. Po upływie 30 minut przepłukać miski ciepłą bieżącą wodą i pozostawić do wyschnięcia.