

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 2/2024
Dyrektora Schroniska
dla Zwierząt we Włocławku
z dnia 30 stycznia 2024 r.

PROCEDURA DEZYNFEKCJI KLATEK W KOCIEJ IZOLATCE i KWARANTANNIE KOCIEJ

Środek do dezynfekcji VIRCON S -stężenie 1% (10G/ 1 l).

Dezynfekcja 2 x dziennie i po każdym opuszczeniu klatki przez zwierzę w obecności innych zwierząt.

1. Założyć rękawiczki jednorazowe i przełożyć zwierzę do innej klatki
2. Opróżnić klatkę z pośłania, misek i kuwety i umyć klatkę detergentem.
3. Nanieść roztwór Virkon S przy użyciu atomizera na dno klatki, następnie na ścianki, sufit oraz wewnętrzną i zewnętrzną stronę kraty klatki, roztwór pozostawić do wyschnięcia na czas 30 minut.
4. Po 30 minutach klatkę dodatkowo odkazić parownicą ręczną nanosząc strumień pary na dno, ścianki, sufit oraz obydwie strony kraty jeśli w klatce przebywało zwierzę z chorobą zakaźną.
5. Do suchej klatki można włożyć czyste pośłanie, kuwetę i miski oraz wprowadzić nowe zwierzę.
6. Klatkę w której tymczasowo przebywało zwierzę należy odkazić preparatem Vircon S i pozostawić do wyschnięcia.

PROCEDURA DEZYNFEKЦИИ POMIESZCZENIA I KLATEK W IZOLATCE I KWARRANTANNIE KOCIEJ

Dezynfekcja wykonywana po opuszczeniu pomieszczenia przez wszystkie zwierzęta lub 1 x w miesiącu lub częściej izolatka bez zwierząt w pomieszczeniu.

Środek do dezynfekcji Vircon S roztwór 1%.

1. Założyć odzież ochronną i rękawiczki.
2. Wszystkie klatki oraz ściany i podłogę wyczyścić i wymyć detergentem .
3. Każdą klatkę spryskać przy użyciu parownicy z preparatem Vircon S nanosząc środek na dno klatki, ściany ,sufit, wewnętrzną i zewnętrzną stronę kraty klatki.
3. Czynność powtórzyć w każdej klatce izolatki.
4. Roztwór Vircon S nanieść na ściany i parapety i drzwi ,na końcu na podłogę i pozostawić do wyschnięcia na co najmniej 30 minut.
5. Po wyschnięciu włączyć lampę antybakteryjną na 4 godziny.

PROCEDURA DEZYNFEKЦИИ KORYTARZA PRZY IZOLATCE I KWARANTANNIE KOCIEJ

Środek do dezynfekcji VIRCON S -stężenie 1% (10G/ 1 l).

Dezynfekcja 2 x dziennie.

1. Zamieść nadmiar brudu.
2. Założyć odzież ochronną i rękawiczki.
3. Umyć podłogę rozcieńczonym preparatem Vircon S i pozostawić na 30 minut to wyschnięcia.
4. Nasączyć specjalistyczne maty dezynfekujące rozcieńczonym Virconem S.

PROCEDURA DEZYNFEKCJI KORYTARZA PRZY IZOLATCE I KWARANTANNIE KOCIEJ

Środek do dezynfekcji VIRCON S -stężenie 1% (10G/ 1 l).

Dezynfekcja 1 x w miesiącu lub częściej w razie potrzeby.

1. Zamieść nadmiar brudu.
2. Założyć odzież ochronną i rękawiczki.
3. Umyć detergentem płytki, drzwi, półki oraz podłogę.
4. Parownicą w której jest rozcieńczony Vircon S parujemy płytki i drzwi i pozostawiamy na 30 minut.
4. Umyć podłogę rozcieńczonym preparatem Vircon S i pozostawić na 30 minut to wyschnięcia.
5. Nasączyć specjalistyczne maty dezynfekujące rozcieńczonym preparatem Vircon S.

PROCEDURA MYCIA MISEK Z IZOLATKI I KWARANTANNY KOCIEJ – KUCHNIA

1. Brudne miski zebrać po jedzeniu i przenieść do zlewu w kuchni, wstępnie opłukać ciepłą wodą i umyć detergentem.
2. Spryskać rozcieńczonym preparatem Vircon S miski i zostawić na 30 minut.
3. Po upływie 30 minut przepłukać miski ciepłą bieżącą wodą i pozostawić do wyschnięcia.

PROCEDURA MYCIA KUWET Z IZOLATKI ORAZ KWARANTANNY- KORYTARZ PRZY IZOLATCE I KWARANTANIE KOCIEJ

1. Brudne kuwety oczyścić z brudu i przenieść na korytarz obok izolatek i kwarantanny kociej i opłukać bieżącą wodą a następnie umyć detergentem z każdej strony.
2. Kuwety zdezynfekować przy użyciu parownicy z preparatem Vircon S i pozostawić na 30 minut.
5. Po upływie 30 minut kuwety opłukać bieżącą wodą i pozostawić do wyschnięcia.