

## **PROCEDURA DEZYNFEKЦИИ KLATEK W KOCIEJ IZOLATCE I KWARRANTANNIE KOCIEJ**

**Środek do dezynfekcji VIRCON S -stężenie 1% (10G/ 1 l).**

**Dezynfekcja 2 x dziennie i po każdym opuszczeniu klatki przez zwierzę w obecności innych zwierząt.**

1. Założyć rękawiczki jednorazowe i przenieść zwierzę do innej klatki
2. Opróżnić klatkę z pośłania, misek i kuwety i umyć klatkę detergentem.
3. Nanieść roztwór Virkon S przy użyciu atomizera na dno klatki, następnie na ścianki, sufit oraz wewnętrzną i zewnętrzną stronę kraty klatki, roztwór pozostawić do wyschnięcia na czas 30 minut.
4. Po 30 minutach klatkę dodatkowo odkazić parownicą ręczną nanosząc strumień pary na dno, ścianki, sufit oraz obydwie strony kraty jeśli w klatce przebywało zwierzę z chorobą zakaźną.
5. Do suchej klatki można włożyć czyste pośłanie, kuwetę i miski oraz wprowadzić nowe zwierzę.
6. Klatkę w której tymczasowo przebywało zwierzę należy odkazić preparatem Vircon S i pozostawić do wyschnięcia.

## **PROCEDURA DEZYNFEKЦИИ POMIESZCZENIA I KLATEK W IZOLATCE I KWARRANTANNIE KOCIEJ**

**Dezynfekcja wykonywana po opuszczeniu pomieszczenia przez wszystkie zwierzęta lub 1 x w miesiącu lub częściej izolatka bez zwierząt w pomieszczeniu.**

**Środek do dezynfekcji Vircon S roztwór 1%.**

1. Założyć odzież ochronną i rękawiczki.
2. Wszystkie klatki oraz ściany i podłogę wyczyścić i wymyć detergentem .
3. Każdą klatkę spryskać przy użyciu parownicy z preparatem Vircon S nanosząc środek na dno klatki, ściany ,sufit, wewnętrzną i zewnętrzną stronę kraty klatki.
3. Czynność powtórzyć w każdej klatce izolatki.
4. Roztwór Vircon S nanieść na ściany i parapety i drzwi ,na końcu na podłogę i pozostawić do wyschnięcia na co najmniej 30 minut.
5. Po wyschnięciu włączyć lampę antybakteryjną na 4 godziny.

## **PROCEDURA DEZYNFEKЦИИ KORYTARZA PRZY IZOLATCE I KWARANTANNIE KOCIEJ**

**Środek do dezynfekcji VIRCON S -stężenie 1% (10G/ 1 l).**

**Dezynfekcja 2 x dziennie.**

1. Zamieść nadmiar brudu.
2. Załóż odzież ochronną i rękawiczki.
3. Umyć podłogę rozcieńczonym preparatem Vircon S i pozostawić na 30 minut do wyschnięcia.
4. Nasączyć specjalistyczne maty dezynfekujące rozcieńczonym Virconem S.

## **PROCEDURA DEZYNFEKCJI KORYTARZA PRZY IZOLATCE I KWARANTANNIE KOCIEJ**

**Środek do dezynfekcji VIRCON S -stężenie 1% (10G/ 1 l).**

**Dezynfekcja 1 x w miesiącu lub częściej w razie potrzeby.**

1. Zamieść nadmiar brudu.
2. Założyć odzież ochronną i rękawiczki.
3. Umyć detergentem płytki, drzwi, półki oraz podłogę.
4. Parownicą w której jest rozcieńczony Vircon S parujemy płytki i drzwi i pozostawiamy na 30 minut.
4. Umyć podłogę rozcieńczonym preparatem Vircon S i pozostawić na 30 minut to wyschnięcia.
5. Nasączyć specjalistyczne maty dezynfekujące rozcieńczonym preparatem Vircon S.

## **PROCEDURA MYCIA MISEK Z IZOLATKI I KWARANTANNY KOCIEJ – ZMYWAK.**

1. Brudne miski zebrać po jedzeniu wstępnie wyczyścić.
2. Załadować w kosze do przewożenia wyłożone jednorazowymi workami plastikowymi.
3. Przewieść miski do pomieszczenia gdzie znajduje się zmywarka do mycia misek.
4. Załadować brudne miski do zmywarki gospodarczej
5. Włączyć mycie oraz parowanie. (Czas mycia 3 minuty)
6. Czyste miski przenieść do kuchni.

## **PROCEDURA MYCIA KUWET Z IZOLATKI ORAZ KWARRANTANNY- ZMYWAK**

1. Brudne kuwety oczyścić z brudu.
2. Włożyć do przeznaczonego kosza na brudne kuwety wyłożonego jednorazowym workiem plastikowym.
3. Załadować oczyszczone kuwety do zmywarki gospodarczej.
4. Włączyć mycie oraz parowanie. (Czas mycia 3 minuty)
5. Umyte i suche kuwety przenieść na korytarz na wyznaczone miejsce dla kuwet .