

PROCEDURA DEZYNFEKЦИИ KLATEK W IZOLATCE I KWARRANTANNIE KOCIEJ

Środek do dezynfekcji VIRCON S -stężenie 1% (10G/ 1 l).

Dezynfekcja 2 x dziennie i po każdym opuszczeniu klatki przez zwierzę w obecności innych zwierząt.

1. Założyć rękawiczki jednorazowe oraz ubrać jednorazową odzież ochronną i przełożyć zwierzę do innej klatki
2. Opróżnić klatkę z pośłania, misek i kuwety.
3. Brudne pośłania przełożyć do czarnego worka plastikowego, pellet/ trociny przełożyć do przeznaczonego na odpady czarnego worka, miski przełożyć do kosza na brudne miski z izolatki/kwarantanny, opróżnione kuwety włożyć do kosza na brudne kuwety z izolatki/kwarantanny.
4. Z klatki zebrać brud zostawiony po kocie i wyrzucić do czarnego worka na odpady.
5. Nanieść roztwór Virkon S przy użyciu atomizera na dno klatki, następnie na ścianki, sufit oraz wewnętrzną i zewnętrzną stronę kraty, klatki, roztwór (pozostawić do wyschnięcia na czas 30 minut).
6. Po 30 minutach klatkę dodatkowo odkazić parownicą ręczną, nanosząc strumień pary na dno, ścianki, sufit oraz obydwie strony kraty jeśli w klatce przebywało zwierzę z chorobą zakaźną.
7. W czasie kiedy roztwór Virkon S schnie, można przyszykować pośłanie (przyniesione z magazynu na pośłania), świeżą wodę przyniesioną z kuchni oraz kuwetę, którą trzeba wypełnić pelletem/ trocinami (który znajduje się w pomieszczeniu).
8. Do suchej klatki można włożyć czyste pośłanie, kuwetę i miski oraz wprowadzić nowe zwierzę.
9. Klatkę w której tymczasowo przebywało zwierzę należy odkazić preparatem Virkon S i pozostawić do wyschnięcia.
10. Zdjąć jednorazową odzież ochronną i umieścić w czarnym plastikowym worku wraz z pośłaniami.
11. Po zakończeniu sprzątania w pomieszczeniu czarne worki zawiązać i przenieść do kontenera na odpady mieszane.
12. Podpisać rejestr dezynfekcji, dezynsekcji i sprzątania u kotów.

PROCEDURA DEZYNFEKCJI POMIESZCZEŃ I KLATEK W IZOLATCE I KWARANTANNIE KOCIEJ

Dezynfekcja wykonywana po opuszczeniu pomieszczenia przez wszystkie zwierzęta lub 1 x w miesiącu lub częściej bez zwierząt w pomieszczeniu.

Środek do dezynfekcji Vircon S roztwór 1%.

1. Założyć odzież ochronną i rękawiczki.
2. Każdą klatkę spryskać przy użyciu parownicy z rozcieńczonym preparatem Vircon S, nanosząc środek na dno klatki, ściany, sufit, wewnętrzną i zewnętrzną stronę kraty klatki.
3. Czynność powtórzyć w każdej klatce izolatki.
4. Roztwór Vircon S nanieść na ściany i parapety i drzwi, na końcu na podłogę i pozostawić do wyschnięcia na co najmniej 30 minut.
5. Zdjąć jednorazową odzież ochronną i umieścić w czarnym plastikowym worku wraz z poślaniami.
6. Po wyschnięciu włączyć lampę antybakteryjną na 4 godziny.
7. Podpisać rejestr dezynfekcji, dezynsekcji i sprzątnięcia u kotów.