

PROCEDURA DEZYNFEKЦИИ KORYTARZA PRZY IZOLATCE I KWARANTANNIE KOCIEJ

Środek do dezynfekcji VIRCON S -stężenie 1% (10G/ 1 l).

Dezynfekcja 2 x dziennie.

1. Zamieść nadmiar brudu i wyrzucić do worka z odpadami.
2. Umyć podłogę rozcieńczonym preparatem Vircon S i pozostawić na 30 minut to wyschnięcia.
3. Nasączyć specjalistyczne maty dezynfekujące rozcieńczonym Virconem S.

PROCEDURA DEZYNFEKCJI KORYTARZA PRZY IZOLATCE I KWARANTANNIE KOCIEJ

Środek do dezynfekcji VIRCON S - stężenie 1% (10G/ 1 l).

Dezynfekcja 1 x w miesiącu lub częściej w razie potrzeby.

1. Zamieść nadmiar brudu i wyrzucić do worka z odpadami.
2. Parownicą, w której jest rozcieńczony Vircon S parować płytki i drzwi i pozostawić na 30 minut.
3. Umyć podłogę rozcieńczonym preparatem Vircon S i pozostawić na 30 minut to wyschnięcia.
4. Nasączyć specjalistyczne maty dezynfekujące rozcieńczonym preparatem Vircon S.